

# Инструкция по медицинскому применению препарата **Гепа-Мерц (Hepa-Merz)**

**Регистрационный номер в РФ** П N015093/01 от 22.03.2007

**Торговое название:** Гепа-Мерц

**Международное непатентованное название:** орнитин

**Лекарственная форма:** гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

**Состав:**

5 г гранул содержат

Активное вещество:

L-орнитина-L-аспартата 3 г

**Вспомогательные вещества:**

кислота лимонная безводная

0,55 г

ароматизатор

лимонный 0,02 г

ароматизатор

апельсиновый 0,2 г

натрия сахаринат (сахарин натрия) 0,0045 г

цикломат натрия 0,0405 г

краситель солнечный закат желтый 0,0005 г

поливинилпирролидон (повидон) 0,05 г

фруктоза (левулоза) 1,1345 г

**Описание:**

Смесь гранул оранжевого и белого цвета

**Фармакотерапевтическая группа:**

Препараты для лечения заболеваний печени.

**Код АТХ:** A05BA

**Фармакологические свойства:**

Обладает детоксикационным действием, снижая повышенный уровень аммиака в организме, в частности, при заболеваниях печени. Действие препарата связано с его участием в орнитинном цикле мочевинообразования Кребса (активирует работу цикла, восстанавливая активность ферментов клеток печени: орнитин-карбамоилтрансферазы и карбамоил-фосфатсинтетазы). Способствует выработке инсулина и соматотропного гормона.

Улучшает белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального питания.

Способствует уменьшению астенического, диспептического и болевого синдромов, а также нормализации повышенной массы тела (при стеатозе и стеатогепатите).

**Фармакокинетика:**

L-орнитин-L-аспартат быстро диссоциирует на орнитин и аспартат, и начинает действовать в течение 15-25 мин, имея короткий период полувыведения. Выводится с мочой через цикл мочевинообразования.

**Показания к применению:**

Острые и хронические заболевания печени, сопровождаемые гипераммониемией. Печеночная энцефалопатия (латентная и выраженная). Стеатозы и стеатогепатиты (различного генеза).

**Противопоказания:**

Выраженная почечная недостаточность при показателе креатинина более 3 мг/100 мл, гиперчувствительность к компонентам препарата, период лактации, детский возраст (в связи с недостаточностью данных).

С осторожностью: беременность.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь по 1–2 пакетика гранул, растворенных в 200 мл жидкости, 3 раза в сутки, после еды. Курс приема зависит от тяжести заболевания.

**Побочное действие:**

Со стороны желудочно-кишечного тракта: нечасто: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диарея.

Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: очень редко: боль в конечностях. Краситель солнечный закат желтый может вызвать аллергические реакции.

**Передозировка:**

Симптомы: усиление выраженности побочных действий.

Лечение: промывание желудка, прием активированного

угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: не описано

**Особые указания:**

При постановке диагноза печеночная энцефалопатия из-за основного заболевания необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:**

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г. По 10 или 30 пакетиков (5 г) гранул для приготовления

раствора для приема внутрь, содержащего 3 г L-орнитина-L-аспартата, упаковывают в картонную коробку с инструкцией по применению.

**Срок годности:**

5 лет

не применять после истечения срока годности

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Предприятие-производитель:**

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА»

D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне

**Претензии направлять по адресу:**

ООО «Мерц Фарма»

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,

БЦ «Башня на Набережной», блок С.