

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПАНТОВИГАР

Регистрационный номер: ЛСР-000045-130407

Торговое название: Пантовигар

Лекарственная форма: капсулы

Состав

1 капсула содержит:

Активные вещества:

Медицинские дрожжи 100 мг

Мононитрат тиамин (витамин В1) 60 мг

Кальция Д-пантотенат (витамин В5) 60 мг

Цистин 20 мг

пара-Аминобензойная кислота 20 мг

Кератин 20 мг

Вспомогательные вещества:

Микрокристаллическая целлюлоза 25 мг

Тальк 6 мг

Стеарат магния 6 мг

Повидон 4 мг

Коллоидный диоксид кремния 2 мг

Оболочка капсулы

Желатин 62,1681 мг

Очищенная вода 11,02 мг

Титана диоксид 2,1280 мг

Краситель железа оксид желтый 0,5797 мг

Индигокармин 0,1042 мг

Описание: твердые желатиновые капсулы: крышечка капсулы – темно-зеленого цвета, корпус – белого с кремоватым оттенком цвета. Диаметр капсулы 6,7-6,9 мм и длиной 19,1-19,7 мм.

Содержимое капсулы – светло-коричневый порошок с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство + прочие препараты

Код АТХ: А11JС

Фармакологические свойства: Пантовигар содержит необходимые для волос и ногтей элементы – Д-пантотенат кальция, L-цистин и аминокислоты, кератин. Свойства препарата обусловлены свойствами, входящих в его состав компонентов.

Показания к применению: диффузное выпадение волос негормональной этиологии. Дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения волос солнечным и ультрафиолетовым излучением). Нарушение структуры ногтей.

Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, первая половина беременности (I-II триместры); период грудного вскармливания, детский возраст.

Применение в период беременности и лактации: применяется только по назначению врача во второй половине беременности (III триместр).

Способ применения и дозы: взрослые: 3 раза в день по 1 капсуле внутрь, во время еды, не разжевывая с небольшим количеством жидкости. Средняя продолжительность лечения составляет 3-6 месяцев. По необходимости лечение может быть продолжено или повторено.

Побочное действие: аллергические реакции – кожные реакции в виде зуда и крапивницы; повышенное потоотделение, учащение пульса. Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, метеоризм, боли в области живота.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: если Вы одновременно принимаете сульфаниламидные препараты, Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, можно ли Вам принимать Пантовигар и как его принимать.

Особые указания: инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются показаниями к применению препарата. При данных патологиях препарат может использоваться в составе комбинированной терапии. Так как формирование волос – длительный процесс, важно принимать препарат в указанных дозировках регулярно в течение 3-6 месяцев. Если заболевания волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно прогрессирующее течение, необходимо обратиться к врачу, так как эти заболевания могут быть признаками общих заболеваний.

Форма выпуска: капсулы. По 15 капсул помещают в блистер из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 2, 6 или 10 блистеров помещают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению. По 2 картонных коробки, содержащих по 10 блистеров, упакованы в пачку картонную.

Условия хранения: при температуре не выше 25оС, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года. Не использовать по окончании срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Предприятие-производитель:

«Мерц Фарма ГмБХ и Ко.КГаА» D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне

Офис в Москве ООО «Мерц Фарма": 123317, Москва, Пресненская наб, 10,

блок С «Башня на набережной».