



Инструкция по медицинскому
применению препарата

Гепа-Мерц (Hepa-Merz)



Регистрационный номер в РФ
П N015093/02 от 22.03.2007

Торговое название Гепа-Мерц

**Международное
непатентованное название**
орнитин

Лекарственная форма
концентрат для приготовления
раствора для инфузий

Состав
1 ампула содержит 5г
L-орнитина-L-аспартата, воды
для инъекций до 10 мл.

Описание
Прозрачный раствор
светло-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая
группа**
Гипоазотемическое средство
Код АТХ: A05BA

**Фармакологические
свойства**
Снижает повышенный уровень
аммиака в организме, в
частности, при заболеваниях
печени. Действие препарата
связано с его участием в
орнитиновом цикле
мочевинообразования Кребса
(образование мочевины из

аммиака). Способствует
выработке инсулина и
соматотропного гормона.
Улучшает белковый обмен при
заболеваниях, требующих
парентерального питания.
Фармакокинетика: Выводится
почками.

Показания к применению
Острые и хронические
заболевания печени,
сопровожденные
гипераммониемией.
Печеночная энцефалопатия в
т.ч. в составе комплексной
терапии нарушений сознания
(прекома и коматозное
состояние).
В качестве корректирующей
добавки к препаратам для
парентерального питания у
пациентов с белковой
недостаточностью.

Противопоказания
Выраженная почечная
недостаточность при показателе
креатинина более 3 мг/100 мл.
Гиперчувствительность к
компонентам препарата,
период лактации.
С осторожностью –
беременность.

MN 51182, MC 553, Hepa-Merz Inf.-Konz. russ
561/12394114/0210





Способ применения и дозы

Внутривенно вводят до 4-х ампул в сутки, растворив содержимое ампул в 500 мл инфузионного раствора. При печеночной энцефалопатии в зависимости от степени тяжести состояния вводят до 8 ампул в сутки. Длительность инфузии, частота и продолжительность лечения определяются индивидуально. Максимальная скорость внутривенного введения – 5 г в час. Не растворять более 6 ампул в 500 мл инфузионного раствора!

Побочное действие

Аллергические реакции, в отдельных случаях возможны тошнота и рвота.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных действий.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано

Особые указания

При постановке диагноза печеночная энцефалопатия из-за основного заболевания необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При возникновении тошноты или рвоты следует снизить скорость введения.

Форма выпуска

Концентрата для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/мл, по 10 мл в ампулах темного стекла типа I, DAB 10 с двумя цветными маркировочными кольцами и белой точкой. По 10 ампул (2 пластиковых поддона по 5 ампул) с инструкцией по применению в картонной коробке.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Предприятие-производитель

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА»
D-60318, Германия,
Франкфурт-на-Майне
Претензии направлять по адресу: ООО «Мерц Фарма»
123242, г. Москва,
пер. Капранова, д.3, стр. 2
телефон:
(495) 660-7695
www.merz.ru

